

日本語

試験項目名

←必須

測定種別

←必須(選択)

動物種

←必須(選択)

試験目標

←必須(選択)

試験レベル

←必須(選択)

試験結果表示方法

←必須

試験プロトコール

←必須

備考

←必要であれば入力してください

英語

試験項目名(※)

←必須

測定種別

←自動入力

動物種

←自動入力

試験目標

←自動入力

試験結果表示方法

←必須

試験プロトコール

←必須

備考

| No | 生薬名 | 試験名 濃度 単位 | | | | |
|-----|----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| 1 | イレイセン(威霊仙) | | | | | |
| 2 | インチンコウ(茵陳蒿) | | | | | |
| 3 | ウコン(鬱金) | | | | | |
| 4 | ウヤク(烏薬) | | | | | |
| 5 | エンゴサク(延胡索) | | | | | |
| 6 | オウギ(黄耆) | | | | | |
| 7 | オウゴン(黄芩) | | | | | |
| 8 | オウバク(黄柏) | | | | | |
| 9 | オウヒ(桜皮) | | | | | |
| 10 | オウレン(黄连) | | | | | |
| 11 | オンジ(遠志) | | | | | |
| 12 | ガイヨウ(艾葉) | | | | | |
| 13 | カシュウ(何首烏) | | | | | |
| 14 | ガジュツ(莪朮) | | | | | |
| 15 | カクコン(葛根) | | | | | |
| 16 | カロコン(栝楼根) | | | | | |
| 17 | カンキョウ(乾姜) | | | | | |
| 18 | カンゾウ(甘草) | | | | | |
| 19 | キキョウ(桔梗) | | | | | |
| 20 | キクカ(菊花) | | | | | |
| 21 | キジツ(枳実) | | | | | |
| 22 | キョウカツ(羌活) | | | | | |
| 23 | キョウニン(杏仁) | | | | | |
| 24 | クジン(苦参) | | | | | |
| 25 | クマザサ(熊笹) | | | | | |
| 26 | ケイガイ(荆芥) | | | | | |
| 27 | ケイケツウ(鷄血藤) | | | | | |
| 28 | ケイヒ(桂皮) | | | | | |
| 29 | ゲンジン(玄参) | | | | | |
| 30 | コウカ(紅花) | | | | | |
| 31 | ゴウカンピ(合歡皮) | | | | | |
| 32 | コウジン(紅参) | | | | | |
| 33 | コウブシ(香附子) | | | | | |
| 34A | コウボク(厚朴)(中国産) | | | | | |
| 34B | コウボク(厚朴)(日本産) | | | | | |
| 35 | ゴシツ(牛膝) | | | | | |
| 36 | ゴシュユ(呉茱萸) | | | | | |
| 37 | ゴボウシ(牛蒡子) | | | | | |
| 38 | ゴマ(胡麻) | | | | | |
| 39 | ゴミシ(五味子) | | | | | |
| 40 | サイコ(柴胡) | | | | | |
| 41 | サイシン(細辛) | | | | | |
| 42 | サフラン | | | | | |
| 43 | サンキライ(山帰来) | | | | | |
| 44 | サンシシ(山梔子) | | | | | |
| 45 | サンシチニンジン(三七人参) | | | | | |
| 46 | サンシュユ(山茱萸) | | | | | |
| 47 | サンショウ(山椒) | | | | | |
| 48 | サンソウニン(酸棗仁) | | | | | |
| 49 | サンヤク(山薬) | | | | | |
| 50 | サンリョウ(三棱) | | | | | |
| 51 | ジオウ(地黄) | | | | | |
| 52 | シゴカ(刺五加) | | | | | |
| 53 | ジコツピ(地骨皮) | | | | | |
| 54 | シツリシ(蒺藜子) | | | | | |
| 55A | シャクヤク(芍薬)(中国産) | | | | | |
| 55B | シャクヤク(芍薬)(日本産) | | | | | |
| 56 | シャゼンシ(車前子) | | | | | |
| 57 | ジュクジオウ(熟地黄) | | | | | |
| 58 | シュクシャ(縮砂) | | | | | |
| 59 | ショウキョウ(生姜) | | | | | |
| 60 | ショウマ(升麻) | | | | | |
| 61 | シンイ(辛夷) | | | | | |
| 62 | ジンギョウ(秦艽) | | | | | |
| 63 | セキシャク(赤芍) | | | | | |
| 64 | センキュウ(川芎) | | | | | |
| 65 | ソウジュツ(蒼朮) | | | | | |
| 66 | ソウハクヒ(桑白皮) | | | | | |
| 67 | ソウヨウ(桑葉) | | | | | |
| 68 | ゾクダン(續断) | | | | | |
| 69 | ソウ(蘇葉) | | | | | |

| No | 生薬名 | 試験名 濃度 単位 | | | | |
|-----|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| 70 | ダイオウ(大黃) | | | | | |
| 71 | タイソウ(大棗) | | | | | |
| 72 | タクシャ(沢瀉) | | | | | |
| 73 | タンジン(丹参) | | | | | |
| 74 | チクジョ(竹茹) | | | | | |
| 75 | チクセツニンジン(竹節人参) | | | | | |
| 76 | チモ(知母) | | | | | |
| 77 | チョウジ(丁子) | | | | | |
| 78 | チョウトウコウ(釣藤鈎) | | | | | |
| 79 | チョレイ(猪苓) | | | | | |
| 80 | チンピ(陳皮) | | | | | |
| 81 | テンマ(天麻) | | | | | |
| 82 | テンモンドウ(天門冬) | | | | | |
| 83 | トウガシ(冬瓜子) | | | | | |
| 84A | トウキ(当帰)(中国産大和種) | | | | | |
| 84B | トウキ(当帰)(日本産) | | | | | |
| 85 | トウジン(党参) | | | | | |
| 86 | トウニン(桃仁) | | | | | |
| 87 | ドクカツ(独活) | | | | | |
| 88 | トチュウ(杜仲) | | | | | |
| 89 | ニクジュウヨウ(肉蓯蓉) | | | | | |
| 90A | ニンジン(人参)(湯通し) | | | | | |
| 90B | ニンジン(人参)(生干人参) | | | | | |
| 91 | バイモ(貝母) | | | | | |
| 92 | ハクセンピ(白鮮皮) | | | | | |
| 93 | バクモンドウ(麦門冬) | | | | | |
| 94 | ハッカ(薄荷) | | | | | |
| 95 | ハンゲ(半夏) | | | | | |
| 96 | ビャクシ(白芷) | | | | | |
| 97 | ビャクジュツ(白朮) | | | | | |
| 98 | ビワヨウ(枇杷葉) | | | | | |
| 99 | ビンロウジ(檳榔子) | | | | | |
| 100 | ブクリョウ(茯苓) | | | | | |
| 101 | ボウイ(防已) | | | | | |
| 102 | ボウコン(茅根) | | | | | |
| 103 | ボウフウ(防風) | | | | | |
| 104 | ホウブシ(炮附子) | | | | | |
| 105 | ボクソク(樸椒) | | | | | |
| 106 | ホコツシ(補骨脂) | | | | | |
| 107 | ボタンピ(牡丹皮) | | | | | |
| 108 | マオウ(麻黄) | | | | | |
| 109 | マシニン(麻子仁) | | | | | |
| 110 | マンケイシ(蔓荊子) | | | | | |
| 111 | モッコウ(木香) | | | | | |
| 112 | モツヤク(没薬) | | | | | |
| 113 | ヤクチ(益智) | | | | | |
| 114 | ヤクモソウ(益母草) | | | | | |
| 115 | ヨクイニン(薏苡仁) | | | | | |
| 116 | リュウタン(竜胆) | | | | | |
| 117 | リョウキョウ(良姜) | | | | | |
| 118 | レイシ(靈芝) | | | | | |
| 119 | レンギョウ(連翹) | | | | | |

| No | 漢方方剤名 | 試験名 濃度 単位 | | | | | |
|----|--------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| 1 | 温経湯(うんけいとう) | | | | | | |
| 2 | 黄连解毒湯(おうれんげどくとう) | | | | | | |
| 3 | 葛根湯(かっこんとう) | | | | | | |
| 4 | 加味帰脾湯(かみきひとう) | | | | | | |
| 5 | 加味逍遙散(かみしょうようさん) | | | | | | |
| 6 | 桂枝湯(けいしとう) | | | | | | |
| 7 | 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん) | | | | | | |
| 8 | 香蘇散(こうそさん) | | | | | | |
| 9 | 牛車腎気丸(ごしゃじんきがん) | | | | | | |
| 10 | 五苓散(ごれいさん) | | | | | | |
| 11 | 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつほれいとう) | | | | | | |
| 12 | 柴胡桂枝湯(さいこけいしとう) | | | | | | |
| 13 | 柴朴湯(さいぼくとう) | | | | | | |
| 14 | 柴苓湯(さいれいとう) | | | | | | |
| 15 | 四逆散(しぎゃくさん) | | | | | | |
| 16 | 四君子湯(しくんしとう) | | | | | | |
| 17 | 芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう) | | | | | | |
| 18 | 小柴胡湯(しょうさいことう) | | | | | | |
| 19 | 小青竜湯(しょうせいりゅうとう) | | | | | | |
| 20 | 真武湯(しんぶとう) | | | | | | |
| 21 | 十全大補湯(じゅうぜんたいほとう) | | | | | | |
| 22 | 大黃甘草湯(だいうかかんぞうとう) | | | | | | |
| 23 | 大建中湯(だいけんちゅうとう) | | | | | | |
| 24 | 大防風湯(だいぼうふうとう) | | | | | | |
| 25 | 釣藤散(ちょうとうさん) | | | | | | |
| 26 | 猪苓湯(ちよれいとう) | | | | | | |
| 27 | 当归芍薬散(とうきしゃくやくさん) | | | | | | |
| 28 | 人參養榮湯(にんじんようえいとう) | | | | | | |
| 29 | 八味地黄丸(はちみじおうがん) | | | | | | |
| 30 | 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう) | | | | | | |
| 31 | 半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう) | | | | | | |
| 32 | 半夏白朮天麻湯(はんげびやくじゅつてんまとう) | | | | | | |
| 33 | 麦門冬湯(ばくもんどうとう) | | | | | | |
| 34 | 白虎加人參湯(びやくこかにんじんとう) | | | | | | |
| 35 | 補中益氣湯(ほちゅうえつきとう) | | | | | | |
| 36 | 防己黃耆湯(ぼういおうぎとう) | | | | | | |
| 37 | 防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん) | | | | | | |
| 38 | 麻黄湯(まおうとう) | | | | | | |
| 39 | 抑肝散(よくかんさん) | | | | | | |
| 40 | 六君子湯(りっくんしとう) | | | | | | |
| 41 | 苓桂朮甘湯(りょうけいじゆつかんとう) | | | | | | |
| 42 | 六味丸(ろくみがん) | | | | | | |

| No | 生薬由来化合物名 | 試験名 濃度 単位 | | | | |
|----|---------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| 1 | Aconitine | | | | | |
| 2 | Albiflorin | | | | | |
| 3 | Alisol A | | | | | |
| 4 | Alisol B | | | | | |
| 5 | Alkannin | | | | | |
| 6 | Amygdalin | | | | | |
| 7 | Arbutin | | | | | |
| 8 | Astragaloside IV | | | | | |
| 9 | Atractylenolide III | | | | | |
| 10 | Atractylodin | | | | | |
| 11 | Atropine Sulfate Hydrate | | | | | |
| 12 | Aucubin | | | | | |
| 13 | Baicalein | | | | | |
| 14 | Baicalin | | | | | |
| 15 | Barbaloin | | | | | |
| 16 | Benzoylmesaconine Hydrochloride | | | | | |
| 17 | Berberine Chloride Hydrate | | | | | |
| 18 | Bergenin | | | | | |
| 19 | Bisdemethoxycurcumin | | | | | |
| 20 | Bufalin | | | | | |
| 21 | Bufotalin | | | | | |
| 22 | Capillarisin | | | | | |
| 23 | (E)-Capsaicin | | | | | |
| 24 | Catalpol | | | | | |
| 25 | (E)-Chlorogenic Acid | | | | | |
| 26 | (E)-Cinnamic Acid | | | | | |
| 27 | Cinobufagin | | | | | |
| 28 | Cinobufotalin | | | | | |
| 29 | Coptisine Chloride | | | | | |
| 30 | Corydaline | | | | | |
| 31 | Costunolide | | | | | |
| 32 | Curcumin | | | | | |
| 33 | Dehydrocorydaline Nitrate | | | | | |
| 34 | Dehydrocostuslactone | | | | | |
| 35 | demethoxycurcumin | | | | | |
| 36 | Dihydrocapsaicin | | | | | |
| 37 | Dimethylesculetin | | | | | |
| 38 | Eleutheroside B | | | | | |
| 39 | (-)-Epigallocatechin Gallate | | | | | |
| 40 | Epihesperidin | | | | | |
| 42 | beta-Eudesmol | | | | | |
| 43 | Evodiamine | | | | | |
| 44 | (E)-Ferulic Acid | | | | | |
| 45 | Geniposide | | | | | |
| 46 | Geniposidic Acid | | | | | |
| 47 | Gentiopicroside | | | | | |
| 48 | [6]-Gingerol | | | | | |
| 49 | Ginsenoside-Rb1 | | | | | |
| 50 | Ginsenoside-Rc | | | | | |
| 51 | Ginsenoside-Rd | | | | | |
| 52 | Ginsenoside-Re | | | | | |
| 53 | Ginsenoside-Rg1 | | | | | |
| 54 | Glabridin | | | | | |
| 55 | Glycyrrhizic Acid | | | | | |
| 56 | Gomisin A | | | | | |
| 57 | Gomisin N | | | | | |
| 58 | Hesperidin | | | | | |
| 59 | Hirsutine | | | | | |
| 60 | Honokiol | | | | | |
| 61 | Hypaconitine | | | | | |
| 62 | Icariin | | | | | |
| 63 | Isofraxidine | | | | | |
| 64 | Isorhynchophylline | | | | | |
| 65 | (Z)-Ligustilide | | | | | |
| 66 | Limonin | | | | | |
| 67 | Liquiritin | | | | | |
| 68 | Loganin | | | | | |
| 69 | Luteolin | | | | | |
| 70 | Magnolol | | | | | |
| 71 | Mesaconitine | | | | | |
| 72 | Naringin | | | | | |
| 73 | Nodakenin | | | | | |
| 74 | Osthole | | | | | |
| 75 | Oxymatrine | | | | | |

| No | 生薬由来化合物名 | 試験名 | | | | |
|-----|------------------------------------|-----|----|----|--|--|
| | | | 濃度 | 単位 | | |
| 76 | Paeoniflorin | | | | | |
| 77 | Paeonol | | | | | |
| 78 | Palmitine Chloride | | | | | |
| 79 | Perillaldehyde | | | | | |
| 80 | Praeruptorin A | | | | | |
| 81 | Puerarin | | | | | |
| 82 | Rhynchophylline | | | | | |
| 83 | Rosmarinic Acid | | | | | |
| 84 | Saikosaponin a | | | | | |
| 85 | Saikosaponin b2 | | | | | |
| 86 | Saikosaponin c | | | | | |
| 87 | Saikosaponin d | | | | | |
| 88 | Schizandrin | | | | | |
| 89 | Senenoside A | | | | | |
| 90 | Senenoside B | | | | | |
| 91 | Shikonin | | | | | |
| 92 | [6]-Shogaol | | | | | |
| 93 | Sinomenine | | | | | |
| 94 | Swertiamarin | | | | | |
| 95 | Timosaponin A-III | | | | | |
| 96 | Wogonin | | | | | |
| 97 | Alisol B Monoceate | | | | | |
| 98 | Borneol Acetate | | | | | |
| 99 | Butyryl Parahydroxybenzoate | | | | | |
| 100 | Chikusetsusaponin IV | | | | | |
| 101 | Emetine Dihydrochloride | | | | | |
| 102 | 4'-O-Glucosyl-5-O-methylvisamminol | | | | | |
| 103 | Glycohyodeoxycholic Acid | | | | | |
| 104 | L-Menthol | | | | | |
| 105 | (E)-2-Methoxycinnamaldehyde | | | | | |
| 106 | Resibufogenin | | | | | |
| 107 | Rhein | | | | | |

富山大学和漢医薬学総合研究所
探索研究: 活性試験結果報告書(入力例)

日本語

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 試験項目名 | DPP4阻害作用 |
| 測定種別 | コントロール比 |
| 動物種 | その他 |
| 試験目標 | 内分泌・代謝系 |
| 試験レベル | Cell-free |
| 試験結果表示方法 | コントロール(水)のDPP4活性を100%とし、コントロールに対する増減率をDPP4阻害率(%)とした。 |
| 試験プロトコール | 1) 試験物質溶液10 μ lと測定緩衝液25 μ l, DPP4溶液を96wellプレート上で混和。 2) 37°Cで10分間静置後にH-Gly-Pro-AMC溶液50 μ lを加えて混合し、37°Cに加温。 3) 蛍光強度を測定(励起波長380nm、蛍光波長460nm)。 |
| 備考 | |

英語

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 試験項目名(※) | Inhibition of DPP4 |
| 測定種別 | Ratio to control (%) |
| 動物種 | Others |
| 試験目標 | Endcrine & Metabolic systems |
| 試験結果表示方法 | The value of dipeptidyl peptidase IV (DPP4) enzyme activity with water is determined as 100%. Data of drug treatment are revealed as inhibition % against the DPP4 activity. The positive value means DPP4 inhibition effect. |
| 試験プロトコール | 1) Test drug is mixed with 30 μ l of assay buffer, 10 μ l of diluted DPP. 2) Add 50 μ l of diluted substrate solution to wells. 3) The mixture is incubated for 30 min at 37° C. 4) DPP4 inhibition activity is measured by the fluorecence using an excitation wavelength of 380 nm and an emission wavelength of 460 nm. |
| 備考 | |

富山大学和漢医薬学総合研究所
探索研究: 活性試験結果報告書(入力例)

| No | 生薬名 | 試験名 濃度 単位 | DPP4活性阻害 | | | |
|----|----------------|-----------------|----------|-------|--|--|
| | | | 10 | 20 | | |
| | | | mg/mL | mg/mL | | |
| 1 | インチンコウ(茵陳蒿) | | 10 | 15 | | |
| 2 | ウコン(鬱金) | | 20 | 25 | | |
| 3 | ウヤク(烏薬) | | 30 | 35 | | |
| 4 | エンゴサク(延胡索) | | 40 | 45 | | |
| 5 | オウギ(黄耆) | | 50 | 55 | | |
| 6 | オウゴン(黄芩) | | 60 | 65 | | |
| 7 | オウバク(黄柏) | | 70 | 75 | | |
| 8 | オウレン(黄连) | | 80 | 85 | | |
| 9 | オンジ(遠志) | | 90 | 95 | | |
| 10 | ガイヨウ(艾葉) | | 100 | 100 | | |
| 11 | カシュウ(何首烏) | | 10 | 15 | | |
| 12 | ガジュツ(義朮) | | 20 | 25 | | |
| 13 | カッコン(葛根) | | 30 | 35 | | |
| 14 | カロコン(栝楼根) | | 40 | 45 | | |
| 15 | カンキョウ(乾姜) | | 50 | 55 | | |
| 16 | カンゾウ(甘草) | | 60 | 65 | | |
| 17 | キキョウ(桔梗) | | 70 | 75 | | |
| 18 | キクカ(菊花) | | 80 | 85 | | |
| 19 | キジツ(枳実) | | 90 | 95 | | |
| 20 | キョウカツ(羌活) | | 100 | 100 | | |
| 21 | キョウニン(杏仁) | | 10 | 15 | | |
| 22 | クジン(苦参) | | 20 | 25 | | |
| 23 | クマザサ(熊笹) | | 30 | 35 | | |
| 24 | ケイガイ(荆芥) | | 40 | 45 | | |
| 25 | ケイケツウ(鷄血藤) | | 50 | 55 | | |
| 26 | ケイヒ(桂皮) | | 60 | 65 | | |
| 27 | コウカ(紅花) | | 70 | 75 | | |
| 28 | ゴウカンピ(合歡皮) | | 80 | 85 | | |
| 29 | コウジン(紅参) | | 90 | 95 | | |
| 30 | コウブシ(香附子) | | 100 | 100 | | |
| 31 | コウボク(厚朴) | | 10 | 15 | | |
| 32 | ゴシツ(牛膝) | | 20 | 25 | | |
| 33 | ゴシュユ(呉茱萸) | | 30 | 35 | | |
| 34 | ゴボウシ(牛蒡子) | | 40 | 45 | | |
| 35 | ゴマ(胡麻) | | 50 | 55 | | |
| 36 | ゴミシ(五味子) | | 60 | 65 | | |
| 37 | サイコ(柴胡) | | 70 | 75 | | |
| 38 | サイシン(細辛) | | 80 | 85 | | |
| 39 | サフラン | | 90 | 95 | | |
| 40 | サンキライ(山帰来) | | 100 | 100 | | |
| 41 | サンシシ(山梔子) | | 10 | 15 | | |
| 42 | サンシチニンジン(三七人參) | | 20 | 25 | | |
| 43 | サンシュユ(山茱萸) | | 30 | 35 | | |
| 44 | サンショウ(山椒) | | 40 | 45 | | |
| 45 | サンソウニン(酸棗仁) | | 50 | 55 | | |
| 46 | サンリョウ(三稜) | | 60 | 65 | | |
| 47 | ジオウ(地黄) | | 70 | 75 | | |
| 48 | シゴカ(刺五加) | | 80 | 85 | | |
| 49 | ジコッピ(地骨皮) | | 90 | 95 | | |
| 50 | シツリシ(蒺藜子) | | 100 | 100 | | |
| 51 | シャクヤク(芍薬) | | 10 | 15 | | |
| 52 | シャゼンシ(車前子) | | 20 | 25 | | |
| 53 | ジュクジオウ(熟地黄) | | 30 | 35 | | |
| 54 | ショウキョウ(生姜) | | 40 | 45 | | |
| 55 | ショウマ(升麻) | | 50 | 55 | | |
| 56 | シンイ(辛夷) | | 60 | 65 | | |
| 57 | ジンギョウ(秦艽) | | 70 | 75 | | |
| 58 | セキシヤク(赤芍) | | 80 | 85 | | |
| 59 | センキュウ(川芎) | | 90 | 95 | | |
| 60 | センブリ(当薬) | | 100 | 100 | | |
| 61 | ソウジュツ(蒼朮) | | 10 | 15 | | |
| 62 | ソウハクヒ(桑白皮) | | 20 | 25 | | |
| 63 | ソウヨウ(桑葉) | | 30 | 35 | | |
| 64 | ソクダン(續断) | | 40 | 45 | | |
| 65 | ソヨウ(蘇葉) | | 50 | 55 | | |
| 66 | ダイオウ(大黃) | | 60 | 65 | | |
| 67 | タイソウ(大棗) | | 70 | 75 | | |
| 68 | タクシャ(沢瀉) | | 80 | 85 | | |
| 69 | タンジン(丹参) | | 90 | 95 | | |
| 70 | チクセツニンジン(竹節人參) | | 100 | 100 | | |

富山大学和漢医薬学総合研究所
探索研究: 活性試験結果報告書(入力例)

| | | | | | |
|-----|--------------|-----|-----|--|--|
| 71 | チモ(知母) | 10 | 15 | | |
| 72 | チョウジ(丁子) | 20 | 25 | | |
| 73 | チョウトウコウ(釣藤鈎) | 30 | 35 | | |
| 74 | チヨレイ(猪苓) | 40 | 45 | | |
| 75 | チンピ(陳皮) | 50 | 55 | | |
| 76 | テンマ(天麻) | 60 | 65 | | |
| 77 | テンモンドウ(天門冬) | 70 | 75 | | |
| 78 | トウキ(当帰) | 80 | 85 | | |
| 79 | トウジン(党参) | 90 | 95 | | |
| 80 | トウニン(桃仁) | 100 | 100 | | |
| 81 | ドクカツ(独活) | 10 | 15 | | |
| 82 | トチュウ(杜仲) | 20 | 25 | | |
| 83 | ニクジュウヨウ(肉苁蓉) | 30 | 35 | | |
| 84 | ニンジン(人参) | 40 | 45 | | |
| 85 | バイモ(貝母) | 50 | 55 | | |
| 86 | ハクセンピ(白鮮皮) | 60 | 65 | | |
| 87 | バクモンドウ(麦門冬) | 70 | 75 | | |
| 88 | ハッカ(薄荷) | 80 | 85 | | |
| 89 | ハンゲ(半夏) | 90 | 95 | | |
| 90 | ビャクシ(白芷) | 100 | 100 | | |
| 91 | ビャクジュツ(白朮) | 10 | 15 | | |
| 92 | ピワヨウ(枇杷葉) | 20 | 25 | | |
| 93 | ピンロウジ(檳榔子) | 30 | 35 | | |
| 94 | フクリョウ(茯苓) | 40 | 45 | | |
| 95 | ボウイ(防已) | 50 | 55 | | |
| 96 | ボウコン(茅根) | 60 | 65 | | |
| 97 | ボウフウ(防風) | 70 | 75 | | |
| 98 | ホウブシ(炮附子) | 80 | 85 | | |
| 99 | ホコツシ(補骨脂) | 90 | 95 | | |
| 100 | ボタンピ(牡丹皮) | 100 | 100 | | |
| 101 | マオウ(麻黄) | 10 | 15 | | |
| 102 | マシニン(麻子仁) | 20 | 25 | | |
| 103 | マンケイシ(蔓荊子) | 30 | 35 | | |
| 104 | モッコウ(木香) | 40 | 45 | | |
| 105 | モツヤク(没薬) | 50 | 55 | | |
| 106 | ヤクチ(益智) | 60 | 65 | | |
| 107 | ヤクモソウ(益母草) | 70 | 75 | | |
| 108 | ヨクイニン(薏苡仁) | 80 | 85 | | |
| 109 | リュウタン(竜胆) | 90 | 95 | | |
| 110 | リョウキョウ(良姜) | 100 | 100 | | |
| 111 | レイシ(靈芝) | 10 | 15 | | |
| 112 | レンギョウ(連翹) | 20 | 25 | | |